

ПАМЯТКА

для граждан Дубовского района, занимающихся содержанием и разведением свиней, о мерах профилактики Африканской чумы свиней.

Африканская чума свиней (АЧС) – контагиозная вирусная болезнь, характеризующаяся сверхострым, острым, подострым, реже хроническим течением и высокой летальностью. Болеют домашние и дикие свиньи независимо от возраста и породы.

Возбудитель АЧС – вирус, который устойчив к физическому и химическому воздействию, в трупах свиней сохраняется до 10 недель, навозе – до 5 месяцев и более, от 4 до 5 месяцев, в зависимости от сезона года, в почве, до 4 месяцев в замороженном мясе, копчёной колбасе.

Источником болезни являются больные свиньи, выделяющие вирус во внешнюю среду с мочой, калом, истечениями из носа и другими секретами и экскретами.

Передача вируса здоровым животным осуществляется через заражённые вирусом корма, подстилку, навоз, трупы и продукты убоя животных (мясо, мясопродукты, кровь), а также заражёнными вирусом клещами.

Между заражением и проявлением клинических признаков может пройти от 2 до 22 суток.

При остром течении болезни – возможна гибель животных либо в течение 1-3 дней после появления первых признаков болезни: повышения температуры тела (41-42°C), учащённое дыхание и покраснение кожи. Часто супоросные свиноматки abortируют. На различных участках кожи больных животных могут появляться фиолетово-красные пятна, не бледнеющие при надавливании. Наблюдаются кровавистые истечения из носа, понос с примесью крови, признаки пневмонии и отёка лёгких, серозно-геморрагический конъюнктивит, могут развиваться судороги, парезы и параличи конечностей.

Средства лечения и профилактики африканской чумы свиней не разработаны.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАНОСА ВОЗБУДИТЕЛЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ

В целях недопущения и распространения заболевания на территории района ветеринарная служба обращается к населению содержащему в личном подсобном хозяйстве свиней и требует:

- обеспечить без выгульное содержание свиней на подворьях и во всех свиноводческих хозяйствах независимо от форм собственности. Лучший способ уберечь поголовье – максимальная его изоляция.
 - запрещается производить убой животных на мясо без предубойного осмотра животного ветеринарным специалистом. Убой животных производить только на бойне.
 - постоянно проводить наблюдение за состоянием поголовья домашних и диких свиней и в случае заболевания немедленно информировать ветеринарную службу.
 - пищевые отходы скормливать только после их термической обработки.
 - с территорий субъектов РФ неблагоприятных по АЧС, а так же неблагоприятных районов Волгоградской области запрещен ввоз животных, охотничьих трофеев, животноводческой продукции, кормов и оборудования используемого для выращивания и переработки свиней.
- вывоз и ввоз животных на территорию района проводить с разрешения гос. вет. службы и при наличии ветеринарных сопроводительных документов с 30 дн. карантинированием перед вводом в основное стадо.
- обеспечить доступ к обслуживанию свиней ветеринарными специалистами (проведение вакцинаций и необходимых клинических исследований, периодическое осуществление ветеринарных осмотров животных и др.)

МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ СВИНЕЙ АФРИКАНСКОЙ ЧУМОЙ

При возникновении подозрения на заболевание свиней африканской чумой руководитель хозяйства (владелец животных) и ветеринарный специалист, обслуживающий хозяйство (населённый пункт), обязаны немедленно сообщить о возникшем подозрении специалистам государственной ветеринарной службы и до их прибытия в хозяйство (населённый пункт):

изолировать больных и подозрительных по заболеванию свиней в том же помещении, в котором они находились;

прекратить убой и реализацию животных всех видов (включая птицу) и продуктов их убоя (мяса, сала, шкур, пера, пуха и т.п.);

приостановить вывоз с территории хозяйства (фермы, двора) продуктов и сырья животного происхождения, кормов и других грузов.